

Avertissements agricoles



Bulletin technique n° 25 du 1er septembre 1989

* COLZA : les herbicides utilisables en post-levée

*** CONTRE LES REPOUSSES DE CEREALES** : en cas d'infestation massive et précoce (dès la levée du colza), intervenez rapidement avec un anti-graminée de post-levée à action foliaire.

Attention : par temps chaud, traitez de préférence le soir.

Attendez qu'un maximum de repousses soient présentes pour intervenir. Tenez compte du stade végétatif des repousses pour définir la dose du produit.

En application tardive, les herbicides racinaires peuvent aussi être utilisés.

*** CONTRE MATRICAIRES, LAITERONS ...** : utilisez Lontrel SF 100.

*** AUTRES CAS** : les herbicides utilisables en post-levée du colza figurent au dos du bulletin.

LES ANTIGRAMINEES SPECIFIQUES DE POST-LEVEE A ACTION FOLIAIRE

Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
aloxymide-sodium	FERVIN + huile	1 kg + 3 l huile	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active en soirée si temps sec. Action essentiellement sur graminées.
		1 kg à 1,25 kg + 3 l huile contre graminées vivaces.	
sethoxydime	FERVINAL	2 l + 3 l huile	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). Action essentiellement sur graminées.
		3 l + 3 l huile SCHERING contre graminées vivaces.	
fluazifop-p-butyl	FUSILADE X 2	0,75 L	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées.
	AGRAL	0,1 % vol.	<ul style="list-style-type: none"> Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec).
		1,5 l + 0,1 % Vol. AGRAL	<ul style="list-style-type: none"> Très bonne efficacité sur graminées contre graminées vivaces.
haloxyfop-éthoxyéthyl	GALLANT	1 l	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Uniquement à l'automne. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). Action essentiellement sur graminées. Contre graminées vivaces et Pâturin.
quizalofop-éthyl	TARGA + huile	1,25 l	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées.
		2 l	<ul style="list-style-type: none"> Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). Action essentiellement sur graminées.
		huile SIFREN	<ul style="list-style-type: none"> Contre pâturins au stade 1 à 3 feuilles maximum et graminées vivaces.
		3 l + 2 l huile SIFREN	

TOUTE REPRODUCTION MEME PARTIELLE EST SOUMISE A NOTRE AUTORISATION

Imprimerie de la Station de STRASBOURG
Directeur-Gérant : P. BERTHIER

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
D. R. A. F.
Service Régional de la Protection des Végétaux

Publication périodique

CPPAP n° 1848 AD

Abonnement annuel : 180,-F

Cité Administrative
67084 STRASBOURG CEDEX

☎ 88.37.32.18
Bas-Rhin : 88.69.65.89 - Haut-Rhin : 89.72.49.70

P368



DESHERBAGE COLZA
Herbicides utilisables en post levée

	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
post-levée précoce	métazachlore	BUTISAN S	2,5 l	<p>A utiliser dès le stade "cotylédons étalés - 1ère feuille pointante du colza". La firme préconise ce type d'application pour les semis en conditions difficiles.</p> <p>A la dose de 2,5 l, avant la levée des adventices : Bon sur Capselle, Coquelicot, Mouron. Moyen sur Véronique et Pensée.</p>
post-levée	carbétamide	LEGURAME M	3 kg	<p>Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation.</p> <p>Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées Insuffisante sur dicotylédones contre chiendent de Novembre à fin janvier</p>
			5 à 6 kg	
	propyzamide	KERB flo	1,8 l	<p>A partir du stade 2 feuilles vraies du colza (B2) jusqu'à la reprise de végétation. Application sur sol gelé Bonne action sur graminées Insuffisante sur dicotylédones contre Avoine à chapelet contre chiendent rampant</p>
			2,5 l 3,8 l	
	propyzamide + diuron	KERB ULTRA	1,2 kg	<p>A partir du stade 4 feuilles vraies bien développées, 6ème feuilles naissante des colzas sains bien implantés. De préférence avant l'hiver.</p> <p>Bonne action sur graminées Action limitante sur Sanves, Ravenelles. A utiliser par temps humide couvert et frais.</p>
post-levée	carbétamide + diméfuron	PRADONE TS	3,5-4 kg	<p>A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés Application possible sur sol gelé</p> <p>Action sur dicotylédones : * efficace sur véronique, Matricaire, Stellaire, Coquelicot, Lamier * irrégulier sur : Pensée, Gaillet * Insuffisant sur : Sanve</p>
	diméfuron + clopyralide	CLERDONE	2,5 l	<p>Sur colza sain bien enraciné (pivot > 10 cm), à partir du stade 4 feuilles vraies du colza.</p> <p>Bonne action antidicotylédones.</p> <p>Ne pas utiliser en mélange avec un antigraminée à action foliaire ; respecter 10 jours d'intervalle entre les traitements. Peut s'utiliser en mélange avec un antigraminée à action racinaire.</p> <p>* Sur Capselle : intérêt du programme : BUTISAN 1,5 l post-semis CLERDONE 2,5 l post-levée * Sur Géranium : intérêt du programme : DEVRIOL : 2,2 l post-semis CLERDONE : 2,5 l post-levée</p>
	clopyralid	LONTREL SF 100	0,75 à 1,25 l + huile SCHERING 3 l/ha	<p>S'emploie de la levée du colza jusqu'au stade boutons floraux</p> <p>Spectre d'action : Composés (Matricaires, Anthémis, Chardons, Laiterons) et Légumineuses.</p>